

弘光科技大學

109 學年度大學部暨二年制專科部轉學生招生考試試題

准考證號碼：□□□□□□□□□□

(請考生自行填寫)

年制：四技三年級

系別：護理系

考試科目 (一)：內外科護理學 (含實驗)

【注意事項】

1. 請先核對考試科目是否相符。
2. 本試題共 25 題，每題 4 分，共 100 分，請依題號順序作答。
3. 本試題均為單選題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選出一個最適當的答案，然後在答案卡上同一題號相對位置方格內，用 2B 鉛筆全部塗黑，答錯不倒扣。
4. 請在試題首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

王先生因左心室衰竭住院，請回答 1-3 題

1. 主要會出現下列哪些症狀？ ① CVP: 6-10 cm H₂O ② 肺微血管楔壓: 12-18 mmHg ③ 呼吸急促 ④ 肺水腫
 - (A) ①②③
 - (B) ②③④
 - (C) ①③④
 - (D) ①②③④
2. 住院期間曾出現急性呼吸困難、端坐呼吸、冒冷汗及咳出大量泡沫狀帶血痰。可能是出現什麼合併症？
 - (A) 肺水腫
 - (B) 肺栓塞
 - (C) 肺炎
 - (D) 心肌梗塞
3. 有關王先生的護理措施，下列何者正確？ ① 給予 morphine 注射 ② 增加液體的攝入量 ③ 平躺或頭低腳高的姿勢，以促進血液回流 ④ 給予毛地黃治療
 - (A) ①②
 - (B) ①④
 - (C) ①②③
 - (D) ①②③④
4. 丁太太今天行經皮冠狀動脈整型術 (PTCA)，下列護理措施何者錯誤？ ① 鼓勵病患檢查後可立即下床如廁 ② 監測病患之心電圖 ③ 給予 Coumadin 並注意 APTT 值 ④ 測量病患穿刺部位近心端的肢端脈搏
 - (A) ①②③
 - (B) ②③④
 - (C) ①③④
 - (D) ①②③④
5. 下列有關周邊動脈阻塞性疾病患者的護理措施，何者適當？ ① 鼓勵戒菸及不吃含咖啡因之飲食 ② 安排床頭抬高，雙腳下垂的姿勢 ③ 建議持續使用熱墊或下肢浸泡熱水 ④ 鼓勵每天走路，逐漸增加距離
 - (A) ①②③
 - (B) ②③④
 - (C) ①②④
 - (D) ①②③④

6. 有關心包膜填塞之臨床表徵，何者為正確？ ①中心靜脈壓升高 ②頸靜脈怒張 ③吸氣時收縮壓升高 > 10 mmHg ④心跳減慢。
- (A) ①②③④
(B) ②③④
(C) ①③④
(D) ①②
7. 協助病人進行柏格－艾倫氏運動（Buerger-Allen exercise）的目的為下列何者？
- (A) 改善大腦皮質缺氧之症狀
(B) 減輕肺部充血之情形
(C) 增進冠狀動脈的血流灌注
(D) 促進下肢血液循環，減輕疼痛。
8. 下列有關 AIDS 的敘述何者錯誤？
- (A) 雞尾酒式療法是以兩種蛋白酶抑制劑加一種反轉錄酶抑制劑的療法
(B) 人類免疫缺乏病毒抗體呈陽性反應
(C) 肺囊蟲肺炎是最常見且常導致 AIDS 病人致死的主因
(D) 當 CD4 淋巴細胞數少於 200 μ l 時應立即開始用藥治療
9. 有關全喉切除術後的護理措施，下列何者適當？
- (A) 告知病患術後會有暫時性一個氣切口
(B) 病患清醒後若無嘔吐情形，即可拔除鼻胃管
(C) 病患坐起或翻身時，需以手支托後頸
(D) 缺乏學習動機的病患，語言訓練應以食道語為優先考量
10. 左眼白內障病患接受囊內摘除術後的護理指導，下列何者正確？
- (A) 下床時盡量從右側下床
(B) 手術後傷口若有輕微發癢，可用熱敷消除
(C) 術後傷口疼痛不適，可使用阿斯匹靈止痛
(D) 手術後一週，即可搭機長途旅遊
11. 有關缺鐵性貧血病患鐵劑補充之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 教導病人採空腹口服鐵劑後喝茶，較容易吸收
(B) 教導鐵劑可與維生素 C 一起服用
(C) 採 Z 字型注射法執行鐵劑注射
(D) 鐵劑注射後須觀察有無發生過敏現象
12. 針對慢性腎臟衰竭患者常出現的貧血現象，下列何者是最常見的醫療處置？
- (A) 給予鐵劑補充
(B) 給予輸血矯正貧血
(C) 給予高生理價值的蛋白質
(D) 給予紅血球生成素

13. 王太太第一次血液透析後出現頭痛、噁心、嘔吐、抽搐等不適時，其與下列何種情況有關？
- (A) 代謝性鹼中毒
 - (B) 出血
 - (C) 感染
 - (D) 透析不平衡症候群
14. 下列何者是腎前性(prerenal)急性腎衰竭的病因？
- (A) 前列腺癌
 - (B) 心輸出量減少
 - (C) 腎絲球腎炎
 - (D) 輸尿管結石
15. 王先生罹患失智症，最近易在感覺強烈尿意感後，隔了短暫時間尿意即不自主流出，此稱何種尿失禁？
- (A) 功能性尿失禁 (functional incontinence)
 - (B) 急迫性尿失禁 (urge incontinence)
 - (C) 溢出性尿失禁 (overflow incontinence)
 - (D) 壓力性尿失禁 (stress incontinence)
16. 下列四種結石型態，何者易在酸化尿液產生？ ①磷酸銨鎂結石 ②磷酸鈣結石 ③尿酸結石 ④胱胺酸結石。
- (A) ①②
 - (B) ①③
 - (C) ②③
 - (D) ③④
17. 當救護車送入一位意識昏迷病患，其心跳：120 次/分，血壓：85/50 mmHg，呼吸速率：35 次/分，呼吸有一股很濃的腐壞水果味，血糖為 550 mg/dl，推測此病患最可能之診斷為：
- (A) 高血糖高滲透壓狀態 (HHS)
 - (B) 乳酸中毒
 - (C) 糖尿病酮酸中毒 (DKA)
 - (D) 低血糖昏迷
18. 當病人 24 小時尿液香草扁桃酸 (Vanillylmandelic Acid; VMA) 檢查結果顯示上升時，則其可能罹患：
- (A) 庫欣氏症候群(Cushing's syndrome)
 - (B) 嗜鉻細胞瘤 (Pheochromocytoma)
 - (C) 愛迪生氏症 (Addison's Disease)
 - (D) 康氏症候群 (Conn's syndrome)

19. 教導病患噉嘴式呼吸之主要目的為何？
- (A) 使呼吸速率變慢
 - (B) 增加吸入的氧氣量
 - (C) 幫助鬆動分泌物
 - (D) 預防呼氣時小氣道早期塌陷
20. 有關抽痰注意事項中，下列何者錯誤？
- (A) 抽痰前先給 100% 氧氣 1 分鐘
 - (B) 抽痰管直徑為氣管內徑的 1/2-2/3 寬
 - (C) 由氣切處抽痰須插入 6-8 吋
 - (D) 避免飯後立即抽痰
21. 對於慢性阻塞性肺疾病患者的出院衛教，下列敘述何者錯誤？
- (A) 若無禁忌，鼓勵每日攝取 2,500 ml 以上液體
 - (B) 鼓勵攝取高碳水化合物飲食
 - (C) 避免到人多擁擠的場所
 - (D) 教導病患節省能量的方法
22. 李先生因消化性潰瘍穿孔接受次全胃切除術 (Billroth-II)，對於術後進食出現腹脹、噁心嘔吐、心悸、頭暈等症狀之護理措施，下列何者最適當？
- (A) 多攝取碳水化合物
 - (B) 用餐時多喝湯
 - (C) 採取少量多餐
 - (D) 進餐後多散步走動。
23. 有關胰臟癌之敘述，下列何者正確？
- (A) 好發於女性，預後佳
 - (B) 胰體及胰尾癌最常見
 - (C) 病患之血清 Amylase 會上升
 - (D) 上腹部及右側肋緣鈍痛為最常見之症狀。
24. 下肢為受皮區之植皮手術病人，手術後第一天，下列護理措施何者錯誤？
- (A) 避免用手直接接觸或壓迫傷口
 - (B) 監測傷口滲液或發出惡臭
 - (C) 鼓勵高蛋白、高熱量飲食
 - (D) 鼓勵病人下床活動。
25. 有關急性胰臟炎的護理措施，下列何者錯誤？
- (A) 依醫囑注射 Morphine 止痛
 - (B) 協助病人臥床休息
 - (C) 由靜脈補充體液與電解質
 - (D) 禁止由口進食，並以鼻胃管減壓引流。