

弘光科技大學

109 學年度第 2 學期大學部暨二年制專科部轉學生招生考試試題

准考證號碼：□□□□□□□□□□

(請考生自行填寫)

年制：四技三年級

系別：護理系

**考試科目 (一)：內外科護理學(含實
驗)**

【注意事項】

1. 請先核對考試科目是否相符。
2. 本試題共 25 題，每題 4 分，共 100 分，請依題號順序作答。
3. 本試題均為單選題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選出一個最適當的答案，然後在答案卡上同一題號相對位置方格內，用 2B 鉛筆全部塗黑，答錯不倒扣。
4. 請在試題首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

1. 下列何者檢驗方式是後天免疫缺乏症候群 (Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) 的確診方法?
 - (A) 血清酵素檢驗(ELISA)
 - (B) 西方墨點法(Western blot)
 - (C) 聚合鏈連鎖反應(PCR)
 - (D) 顆粒凝聚試驗(PA)

2. 有關全身性紅斑狼瘡 (Systemic Lupus Erythematosus, SLE) 病人之護理指導, 下列何者錯誤?
 - (A) 若有腎衰竭情形則須限制蛋白質攝取
 - (B) 哺乳是可行的
 - (C) 女性病患宜採用避孕藥避孕方式為宜
 - (D) 建議步行、游泳等溫和運動, 以不疲累為原則。

3. 幫病患輸血(濃縮性紅血球)時, 下列何者注意事項為錯誤?
 - (A) 剛開始的速度為 20-40 gtts/min
 - (B) 不良反應多發生在開始的 50-100ml 內, 故須在床旁觀察 15 分鐘
 - (C) 血品出血庫之後應於 4 小時內輸完
 - (D) 若使用加壓袋, 壓力不可以超過 200mmHg

4. 林先生在接受化學及放射線治療後, WBC: 1500/ mm³, Lymphocyte: 55%, Seg (neutrophil): 20%, Hb: 9.2 g/dl, 試問其絕對嗜中性白血球 (Absolute neutrophil count, ANC) 為?
 - (A) 130/mm³
 - (B) 300/mm³
 - (C) 520/mm³
 - (D) 825/mm³

5. 食道癌病患受腫瘤壓迫無法進食時, 採取餵食性胃造口術或空腸造口術以利營養攝取, 此為癌症手術形式中的哪一種?
 - (A) 緩解(和)性手術治療
 - (B) 根治性手術治療
 - (C) 輔助性手術治療
 - (D) 支持性手術治療

6. 腫瘤溶解症候群病人的醫療處置中, 下列何者目的為鹼化尿液以預防尿酸沉積在腎臟?
 - (A) 輸注大量的生理食鹽水
 - (B) 輸注重碳酸氫鈉 NaHCO₃
 - (C) 給予陽離子交換樹脂 Kayexalate
 - (D) 給予 Allopurinol

7. 病患行氣切造口術後注意事項下列何者為非?
- (A) 術後 24 小時分泌物多，應行蒸氣吸入
 - (B) 術後 24 小時擔心術後出血，應持續讓氣囊充氣以壓迫止血
 - (C) 每八小時以 2% chlorhexidine 漱口水行口腔護理
 - (D) 使用鎮靜劑要小心，以免抑制咳嗽反射
8. 病人使用顱內壓監測期間，若發現波形塌陷或維持不動，可能的原因為何?
- (A) 病人正在吐氣
 - (B) 壓力高到測不出來
 - (C) 管路鬆脫
 - (D) 三路活塞可能被轉成關閉狀態
9. 對於腦震盪(brain concussion)的敘述，下列何者為正確?
- (A) 它屬於結構性傷害
 - (B) 判斷腦實質傷害是易受傷後頭痛期間的長短作為指標
 - (C) 一般病人不會有腦水腫或腦出血的問題
 - (D) 多發生在撞擊處對側的腦傷害
10. 以藥物控制癲癇之發作時，所應注意的事項下列何者為是?
- (A) 多種藥物的低劑量使用比單一藥物大劑量使用較具效果
 - (B) 手術治療是治療癲癇的第一線選擇
 - (C) 治療期間若病人都沒有發作，則可以停藥
 - (D) 使用 Phenytoin (Dilantin) 需與胃藥間隔半小時，以免影響血中濃度
11. 針對視網膜剝離手術後衛教的重點何者為錯誤?
- (A) 術後初期病人須採全天俯臥
 - (B) 術後 2-3 週避免閱讀
 - (C) 術後眼睛腫脹衛教可以冰敷以緩解不適
 - (D) 術後一個月再更換眼鏡
12. 有關腔隙症候群的評估與處置，下列何者錯誤?
- (A) 最早出現的症狀是感覺異常
 - (B) 腔隙症候群出現時要立即解除壓迫的來源
 - (C) 患肢抬高需高於心臟，以減輕肢體腫脹
 - (D) 皮膚蒼白，指甲床微血管充填會大於 3 秒以上
13. 教導慢性阻塞性肺疾病病人採用橫膈式呼吸與噤嘴式呼吸的目的，下列何者正確? ①降低呼吸作功②增加呼吸速率③減少潮氣容積④促進二氧化碳的排出
- (A) ①②
 - (B) ①④
 - (C) ②③
 - (D) ③④

14. 燒傷後心臟血管系統之變化，下列何者錯誤？
- (A) 血管壁滲透性增加，形成局部水泡及水腫
 - (B) 燒傷面積超過 15~20%，數小時內會發生全身水腫
 - (C) 組織受傷後早期會有低血容積情形
 - (D) 組織受傷後早期會出現血鉀過低
15. 有關肋膜積水的敘述，下列何者正確？
- (A) 觸診震顫在積水部位會明顯增強
 - (B) 是由肋膜腔內微血管滲透壓減少或淋巴回流量增加所致
 - (C) 滲出性肋膜積水 (exudative pleural effusion) 顏色深、內含蛋白質 > 3 gm/dL 且比重 > 1.018
 - (D) 漏出性肋膜積水 (transudative pleural effusion) 主要是由炎症病變所引起
16. 有關心律不整之治療，下列何者正確？
- (A) 2° A-V block 可採去纖維震顫術改善
 - (B) 3° A-V block 可使用頸動脈竇按摩方式改善
 - (C) 心房早期收縮(Atrial premature contraction APC)不需要特別治療
 - (D) 心房纖維顫動(Af)可口服 Heparin 以避免血栓形成
17. 僧帽瓣逆流或狹窄的病人，易出現下列何種症狀？①呼吸困難 ②下肢水腫 ③端坐呼吸 ④咳嗽⑤肝腫大
- (A) ①②③
 - (B) ①③④
 - (C) ②③⑤
 - (D) ②④⑤
18. 有關急性胰臟炎之敘述，下列何者正確？①最常見的病因為膽石症及酒精②血清澱粉酶 (amylase) 及鈣 (calcium) 上升③出血性胰臟炎會出現 Rovsing sign④會造成電解質及酸鹼不平衡
- (A) ①④
 - (B) ①②
 - (C) ②③
 - (D) ③④
19. 慢性腎臟病 (CKD) 病人之抽血檢查結果：GFR：20 c.c./min / 1.73m²、serum creatinine：8.0 mg/dL，依此結果，病人是處於 CKD 的第幾期？
- (A) 第二期
 - (B) 第三期
 - (C) 第四期
 - (D) 第五期

20. 對於蔡先生在急診室測得的動脈血氧氣體分析結果：pH: 7.25、PaCO₂: 31 mmHg、HCO₃⁻: 18 mEq/L 之判讀，下列何者正確？
- (A) 此為呼吸性酸中毒
 - (B) 此為部分代償性呼吸性酸中毒
 - (C) 此為代謝性酸中毒
 - (D) 此為部分代償性代謝性酸中毒
21. 下列何者最可能造成病人出現昏迷、呼吸快而深、血清滲透壓 300 mOsm/kg、血糖值 400 mg/dL 的臨床表徵？
- (A) 蘇莫吉效應 (Somogyi effect)
 - (B) 糖尿病性酮酸中毒
 - (C) 高血糖高滲透壓狀態
 - (D) 急性肝昏迷
22. 有關抗利尿素分泌不當症候群 (SIADH) 病人的護理措施，下列何者錯誤？
- (A) 需預防與高血鈉有關的潛在性傷害
 - (B) 遵守與執行限制液體措施
 - (C) 密切監測血壓、中心靜脈壓及血漿滲透壓的變化
 - (D) 監測有無出現肌肉抽搐或昏迷等中樞神經傷害
23. 血液透析病人之液體攝取量的估計原則，下列何者最適當？
- (A) 前一日尿量加排汗量
 - (B) 取決於下肢水腫程度
 - (C) 兩次透析間體重增加必須控制在 2.0 公斤以內
 - (D) 兩次透析間體重增加以不超過其乾體重 5%
24. 有關敗血症治療之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 若感染部位為中心靜脈注射，應盡速將管路拔除
 - (B) 應立即給與抗生素使用後採集血液培養
 - (C) 予輸液治療並維持中心靜脈壓 ≥ 8 cmH₂O
 - (D) 血壓低時應給與升壓劑使用
25. 有關預防傾倒症候群之護理指導，下列何者正確？①採取少量多餐②採高脂肪、高蛋白、低醣飲食③用餐時可多進食液體食物④用餐時可採半坐臥姿勢，進食後則躺下休息
- (A) ①②③
 - (B) ①③④
 - (C) ②③④
 - (D) ①②④